

Place Patient Label Here

Solicitud y consentimiento para anticonceptivos de barrera (condones masculinos o femeninos, diafragma)

Declaración de participación voluntaria y confidencialidad: Los servicios bajo el Título X son completamente voluntarios. Acepto recibir los servicios por voluntad propia. Entiendo que el personal no me puede obligar a recibir los servicios ni a usar o no usar un método de planificación familiar en particular. Entiendo que tengo derecho a aceptar o rechazar los servicios de planificación familiar y que esto no hará que me nieguen otros servicios o programas que ofrezca esta agencia. Esta información es confidencial y se tratará como tal.

Los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios buenos y malos o complicaciones, que pueden perjudicarme. Me han informado que los beneficios, riesgos y efectos secundarios más frecuentes son los que se mencionan a continuación. Pueden ocurrir otros que no están en la lista.

Eficacia del uso de los condones: 87–98 por ciento
Eficacia del uso del diafragma con espermicida: 83 por ciento

Beneficios	Posibles riesgos y desventajas	Efectos secundarios posibles
<ol style="list-style-type: none">1. Los condones pueden obtenerse con facilidad. No hace falta receta.2. Son discretos: pueden llevarse ocultos en la cartera o bolso.3. Los condones de látex ofrecen protección contra las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH.4. Los condones masculinos permiten que los hombres compartan la responsabilidad del control de la natalidad.5. Pueden usarse durante la lactancia.	<ol style="list-style-type: none">1. Deben usarse cada vez que se tienen relaciones sexuales.2. Los lubricantes con base de aceite pueden dañar el látex.3. Puede interrumpir las relaciones sexuales.4. Mayor riesgo de infecciones pélvicas en el caso del diafragma.5. El tamaño del diafragma lo debe determinar un profesional médico.6. El diafragma debe dejarse puesto durante seis horas después de tener relaciones sexuales, aunque no más de 24 horas7. El diafragma debe usarse con espermicida.8. Puede que sea necesario cambiar el tamaño del diafragma después de dar a luz, un aborto espontáneo o provocado, o subir o bajar más de 10 libras.9. No puede usarse un diafragma durante las seis primeras semanas después de dar a luz.	<ol style="list-style-type: none">1. Reacción alérgica al látex u otros componentes.2. Puede producir irritación vaginal debido a la colocación incorrecta del diafragma o por el espermicida, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, incluido el VIH.

Contraceptive Technology; 22 ed. 2023

1. No quiero quedarme embarazada. Uno de los beneficios de los métodos anticonceptivos es que es posible retrasar el embarazo para más adelante.
- 2 Me han explicado los anticonceptivos que me interesan. Podré cambiar de método o dejar de usar anticonceptivos cuando quiera por ejemplo si quiero quedarme embarazada o si me lo recomienda un médico. Me han dado instrucciones para usar el método que elegí.
3. He leído toda la información anterior o alguien me la ha leído. He tenido la oportunidad de hacer preguntas, las cuales han sido contestadas a mi entera satisfacción. Estando en posesión de mis facultades mentales, asumo la responsabilidad total y eximo al departamento de salud local, incluidos el médico, el personal y los asistentes, de toda responsabilidad por efectos secundarios adversos o embarazos que puedan resultar del método anticonceptivo que me proporcionen. Me han informado de que debo llamar a la clínica cuando quiera dejar de usar alguno de los métodos previos para que me den instrucciones.
4. Me han dado un número de emergencia al que llamar después del horario normal de la clínica o cuando la agencia esté cerrada.
5. He decidido usar condones o diafragmas como método de control de la natalidad.

_____/_____/_____
Fecha Firma de la paciente

_____/_____/_____
Fecha Firma de la paciente

DECLARACIÓN DEL INTÉRPRETE

Si hay un intérprete presente para ayudar a la persona a elegir un método anticonceptivo:

He traducido la información y los consejos que la persona que obtiene el consentimiento le ha dado oralmente a la paciente para usar el método anticonceptivo. He leído a la paciente el formulario de consentimiento en el idioma _____ y le expliqué su contenido. A mi leal saber y entender, la paciente ha entendido la explicación.

Intérprete _____
Fecha

Intérprete _____
Fecha